

## ПАМЯТКА ОСПА ОВЕЦ И КОЗ

Оспа овец и коз — высоко контагиозная вирусная, особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений.

Болезнь широко распространена в Турции, Иране, Пакистане, Афганистане, Индии, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Кувейте и многих других странах Азии и Африки. В нашей стране ее эпизодически регистрируют на пограничных территориях. В текущем году произошел занос инфекции в Ярославскую область, а в октябре заболевание зарегистрировано в Приморском крае. Возбудитель (*Sheep capripoxvirus*) — относится к группе покс-вирусов. Эти ДНК-содержащие вирусы характеризуются эпителиотропностью и относительно большими размерами. Вирус чувствителен к действию высоких температур, нагревание до 53° убивает его за 15 минут. Низкие температуры консервируют вирус до двух лет и более, замораживание консервирует вирус. Обычные дезинфицирующие препараты (карболовая кислота, хлорная известь, растворы едкого натра, формалин, глутаровый альдегид и другие) быстро инактивируют вирус на объектах внешней среды.

Болеют овцы всех возрастов и пород. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Больные животные рассеивают вирус во внешней среде с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками. Вирус, выделяемый со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам аэрогенным путем, но не исключен и алиментарный путь заражения.

Проявление болезни начинается с опухания век и появления серозно-слизистого и серозно-гнойного истечения из глаз и носа. Дыхание затруднено и сопровождается сопящим шумом. Оспенную сыпь чаще обнаруживают на голове, губах, вокруг глаз, на внутренней поверхности передних и задних конечностей, на мошонке и крайней плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке срамных губ у самок.

Специфических средств лечения больных оспой овец не разработано. В качестве специфической профилактики применяют вакцины против оспы овец выпускаемых ФГБУ «ВНИИЗЖ», ГНУ «ВНИИВВиМ Россельхозакадемии» и ФКП «Армавирской биофабрикой».

При возникновении оспы овец на хозяйство накладывают карантин. Трупы овец, павших при наличии клинических признаков, сжигают. Всех клинически здоровых овец прививают против оспы. В случае появления оспы в местностях, где ее не регистрировали в течение 3 лет и более, проводят немедленный убой всех овец неблагополучной группы (больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении).

Меры предосторожности для владельцев: оборудовать при входе дезковрики, ежедневно их заправлять дезинфицирующими веществами, не пускать посторонних в помещения, где содержатся овцы, ухаживать за животными в отдельной одежде и обуви. Приобретать овец только в благополучных хозяйствах и ставить на учёт в ветеринарной службе района.

За несоблюдение ветеринарно-санитарных требований содержания овец, владельцы животных могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

О всех фактах заболевания и падежа животных владельцы обязаны незамедлительно сообщать в ветеринарную службу.