

О профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (заразный узелковый дерматит, кожная бугорчатка) – инфекционная болезнь, характеризующаяся устойчивым повышением температуры тела, поражением лимфатической системы, отеками, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.

Источником вируса являются больные животные и вирусоносители. При возникновении болезни в стаде поражается от 5 до 50%, в отдельных случаях до 75-100% животных, особенно среди скота европейских пород. У 50% заболевших животных можно наблюдать типичные признаки болезни. Человек к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив.

Болезнь наносит значительный экономический ущерб животноводству, вызывая существенное снижение удоев молока и массы тела, временное или постоянное бесплодие быков-производителей, аборт коров и нетелей, повреждение шкуры, а также гибель больных животных, особенно с секундарными инфекциями.

В связи с этим в целях минимизации рисков ухудшения эпизоотической ситуации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота необходимо принять профилактические меры, направленные на:

- обеспечение объективного учета крупного рогатого скота в ЛПХ и КХФ;
- соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные приказом Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. N 551 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г., регистрационный N 46003);
- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
- предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы, восприимчивых животных для осмотра;
- в течение 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной службы обо всех случаях заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на возможное заболевание;
- до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех

восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее — хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017г;

- выполнение в полном объеме требований Ветеринарных правил при осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 05.04.2017 № 166.